

**PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBA**

**NUTARIMAS**

**DĖL 2014 M. CENTRALIZUOTAI IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO  
FONDO BIUDŽETO APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS  
PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO VAISTINIŲ PREPARATŲ DALIES  
PATVIRTINIMO**

2014 m. vasario 20 d. Nr. DT-2/4  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 12 straipsniu bei atsižvelgdama į Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos 2014 m. vasario 13 d. posėdyje priimtą sprendimą, Privalomojo sveikatos draudimo taryba **n u t a r i a** pritarti 2014 m. centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo vaistinių preparatų dalies tvirtinimui (pridedama).

Privalomojo sveikatos draudimo  
tarybos pirmininkas



Gediminas Černiauskas

2014 m. Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo vaistinių preparatų dalies projektas

Eil. Nr.	Vaistinio preparato grupės ar medicinos pagalbos priemonės pavadinimas	Bendrasis vaistinio preparato pavadinimas	Liga, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas ar medicinos pagalbos priemonė pagal TLK-10 AM	Vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės skyrimo sąlygos	ASPĮ	Preliminarus pacientų skaičius
<b>Vaistiniai preparatai</b>						
1.1.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai reumatoidiniam artritui gydyti	Infliximab Etanercept Adalimumab	M05, M06	Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas reumatologas turintis patirties skiriant gydymą šiais vaistais. Gydymas skiriamas pagal pridėdamas vaistų skyrimo indikacijas	ASPĮ turinti licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų reumatologijos paslaugas	406-450
1.2.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai psoriaziniam artritui ir ankilozuojančiam spondilitui gydyti	Infliximab Etanercept Adalimumab	M07, M45	Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas reumatologas turintis patirties skiriant gydymą šiais vaistais. Gydymas skiriamas pagal pridėdamas vaistų skyrimo indikacijas	ASPĮ turinti licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų reumatologijos paslaugas	397-440
1.3.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai juveniliniame artritui gydyti	Etanercept Adalimumab	M08	Gydymą pradėti ir tęsti gali tik vaikų ligų gydytojas ar gydytojas reumatologas turintis patirties skiriant gydymą šiais vaistais. Gydymas skiriamas pagal pridėdamas vaistų skyrimo indikacijas	ASPĮ turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų reumatologijos paslaugas	102-115
1.4.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai Crohn'o ligai ir opiniam kolitui gydyti	Infliximab Adalimumab	K50, K51	Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas gastroenterologas ir/ar gydytojas vaikų gastroenterologas turintis patirties skiriant gydymą šiais vaistais. Gydymas skiriamas pagal pridėdamas vaistų skyrimo indikacijas	ASPĮ turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir/ar suaugusiųjų gastroenterologijos paslaugas	127-140

1.5.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai sunkiai psoriazei gydyti	Infliximab	L40	Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas dermatovenerologas turintis patirties skiriant gydymą šiais vaistais. Užsitęsusi ilgiau nei 6 mėn. sunkios formos (PASI rodiklis >15) liga, kai fototerapija ar standartinis sisteminis gydymas (metotreksatu ar acitretinu) neveiksmingi ar yra kontraindikacijų juos taikyti.	ASPI turinti licenciją teikti III lygio stacionarines dermatovenerologijos paslaugas	41-45
		Etanercept Adalimumab				
2	Antineovaskuliarizuojantys vaistai amžinės geltonosios dėmės degeneracijai gydyti	Ranibizumab	H35.3	Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas oftalmologas turintis patirties skiriant gydymą šiais vaistais. Kriterijai neovaskulinės AGDD gydymui pradėti AGDD neovaskuliarizacijos aktyvumo arba progresavimo kriterijai (bent vienas iš jų) yra: 1. Gyslainės neovaskulinės membranos (toliau – GNV) atsiradimas, kai anksčiau ji nebuvo įtarta ar nustatyta; 2. Naujų kraujosruvų ir/ar subretininio skysčio nustatymas; 3. Dokumentuotas nesenas regos blogėjimas, esant GNV (regėjimo aštrumas su korekcija ne mažiau nei 0,1); 4. GNV padidėjimas, lyginant su prieš tai buvusiu apsilankymu; 5. Nėra struktūrinio fibrozinio pažeidimo foveos centre; 6. Pažeidimo plotas ne didesnis nei 12 regos nervo disko diametro; 7. GNV sudaro ne mažiau kaip pusę pažeidimo ploto. Per pirmus metus skiriama 5-6 injekcijos vienam ligos atvejui, bet ne daugiau 10 injekcijų per dvejus gydymo metus	ASPI turinti licenciją teikti III lygio stacionarines oftalmologijos paslaugas	450-495
		Aflibercept				

3	Specifiniai imunoglobulinai respiracinio sincitijaus viruso profilaktikai	Palivizumab	J12.1, J20.5, J21.0	Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas neonatologas, gydytojas vaikų kardiologas ir/ar gydytojas vaikų pulmonologas turintis patirties skiriant gydymą šiuo vaistu. 1. ≤28 sav. gestacinio amžiaus (GA) neišnešioti naujagimiai, kurių amžius RSV infekcijos sezono pradžioje yra ≤12 mėn.; 2. 29-30 sav. GA neišnešioti naujagimiai, kurių amžius RSV infekcijos sezono pradžioje yra ≤6 mėn.; 3. konsiliumo sprendimu medikamentas gali būti paskirtas ir didesnio GA (>30 sav.) neišnešiotam naujagimiui, kai yra papildomų rizikos veiksnių sunkiai RSV infekcijai.	ASPI turinti licenciją teikti III lygio stacionarines neonatologijos, vaikų kardiologijos ir/ar vaikų pulmonologijos paslaugas	140-200
4	Antinavikiniai vaistai (proteosomos inhibitoriai) daugybinei mielomai gydyti	Bortezomib	C90	Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas hematologas, turintis patirties skiriant gydymą šiuo vaistu. Antros eilės daugybinei mielomai gydyti.	ASPI turinti licenciją teikti III lygio stacionarines hematologijos paslaugas	120-130
5	Monokloniniai antikūnai folikulinei ne Hodžkino limfomai ir stambųjų ląstelių ne Hodžkino limfomai gydyti	Rituximab	C82, C83, C91.1	Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas hematologas turintis patirties skiriant gydymą šiuo vaistu.	ASPI turinti licenciją teikti III lygio stacionarines hematologijos paslaugas	331-365
6	Monokloniniai antikūnai reumatologinėms ligoms gydyti	Rituximab	M05, M06	Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas reumatologas turintis patirties skiriant gydymą šiuo vaistu.	ASPI turinti licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų reumatologijos paslaugas	55-60

7	Monokloniniai antikūnai metastazavusiam gaubtinės arba tiesiosios žarnos vėžiui gydyti	Bevacizumab	C18-C20	Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas turintis patirties skiriant gydymą šiuo vaistu. Pirmos eilės metastazavusio storosios ar tiesiosios žarnos vėžio gydymui derinyje su chemoterapija, vėliau tęsiant monoterapiją.	ASPĮ turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas	120-130
8	Monokloniniai antikūnai plokščiialąsteliniam galvos bei kaklo vėžiui gydyti	Cetuximab	C00-C14, C32	Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas turintis patirties skiriant gydymą šiuo vaistu. Kartu su radioterapija lokaliai išplitusiam plokščiialąsteliniam galvos ir kaklo vėžiui gydyti. Metastazavusiam plokščiialąsteliniam galvos ir kaklo vėžiui gydyti.	ASPĮ turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas	10 – 20
9	Monokloniniai antikūnai agresyviai skrandžio vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti	Trastuzumab	C16	Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas turintis patirties skiriant gydymą šiuo vaistu. Pirmos eilės metastazavusiam skrandžio ar gastroezofaginės jungties vėžiui gydyti.	ASPĮ turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas	8 – 12
10	Monokloniniai antikūnai agresyviai krūties vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti	Trastuzumab	C50	Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas turintis patirties skiriant gydymą šiuo vaistu. Ankstyvajam vėžiui gydyti, gydymo trukmė iki 52 sav.	ASPĮ turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas	160-170